

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2016	Referenzbereich 2015	Anpassung
54030	Präoperative Verweildauer bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur	<= 15,00 % (Toleranzbereich)	<= 15,00 % (Toleranzbereich)	Nein
54031	Perioperative Antibiotikaprophylaxe	>= 95,00 % (Zielbereich)	>= 97,41 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
54033	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Patienten mit Gehunfähigkeit bei Entlassung	<= 2,27 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 3,18 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
54029 (NEU)	Spezifische Komplikationen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur	<= 4,46 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
54036	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Implantatfehlagen, -dislokationen oder Frakturen	<= 4,30 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 3,65 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
54038	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an postoperativen Wundinfektionen	<= 3,14 (Toleranzbereich)	<= 2,70 (Toleranzbereich)	Ja
54040	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Wundhämatomen / Nachblutungen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur	<= 3,72 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 4,02 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
54042	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an allgemeinen Komplikationen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur	<= 2,19 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 2,68 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
54046	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen während des akut-stationären Aufenthaltes	<= 2,00 (90. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 2,01 (90. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja